# Министерство здравоохранения Астраханской области ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»



#### Памятка для населения

### ПИТАНИЕ И ОЖИРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА



Ожирение — одно из самых распространённых во всём мире заболеваний, проявляющееся нарушением общего энергетического баланса организма, обмена веществ, избыточным отложением жира в тканях, особенно в подкожно жировой клетчатке. Всемирная организация здравоохранения особо подчёркивает, что человечество стоит на пороге глобальной эпидемии избыточного веса и ожирения. По масштабам распространённости от ожирения на планете страдает более 1 миллиарда человек. Люди, употребляющие богатую белком пищу, менее

склонны к ожирению. «Лишние» калории, которых мы потребляем больше, чем сжигаем в процессе жизнедеятельности, преобразуются в жир и откладываются там, где нам меньше всего хотелось бы. Пища богатая углеводами, к которым относятся все сладкие, сахаросодержащие продукты, сдобная выпечка, пирожные, конфеты, мороженое, не только содержит большое количество калорий, но и вызывает усиленное образование поджелудочной железой.

Люди, страдающие ожирением, подвержены целому ряду тяжёлых заболеваний. Известно, что гипертоническая болезнь развивается у больных ожирением в 2-3 раза чаще, а ишемическая болезнь сердца, стенокардия – в 3-4 раза чаще, чем у лиц с нормальной массой тела. Такие грозные заболевания, как инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг (инсульт), сердечная недостаточность у больных ожирением встречается в 2-3 раза чаще, а сахарный диабет – в 10 раз чаще, чем у нормальных людей.

#### КЛАССИФИКАЦИИ ОЖИРЕНИЯ

В зависимости от причин возникновения выделяют несколько форм ожирения: алиментарную, гипоталамическую и эндокринную:

- <u>Алиментарно-конституционное</u> ожирение звляется наиболее распространённым. При этой форме возникают повышение аппетита, привычное переедание, ведущее к отложению жира в жировой клетчатке. Ожирение наблюдается у больных относительно более позднего возраста (старше 40 лет) и значительно чаще у женщин, чем у мужчин. Отложению жира также способствует привычка ложиться отдыхать после обеда. Нарушение питания иногда связано с профессиональными особенностями (артисты, официанты), когда наиболее обильное питание переносится на вечернее время, при этом часто употребляется алкоголь.
- Гипоталамическое ожирение развивается при повреждении гипоталамуса.
- <u>Эндокринное ожирение</u> встречается гораздо реже и связано с нарушением функций эндокринных желез (поджелудочная, щитовидная, гипофиз, половые железы). В этих случаях необходимо специальное обследование эндокринологом. Кроме назначения эндокринолога, этим пациентам показана диетотерапия.
- <u>Ятрогенное или медикаментозное форма ожирения</u>, развитию которой способствует приём ряда лекарственных препаратов кортикостероидов, некоторых антидепрессантов, нейролептиков, контрацептивов и т.п.

Также существует классификация ожирения по типу локализации жировой ткани в организме

Учитывая специфическое распределение жировой ткани в организме, выделяют три формы ожирения:

- по верхнему типу или андроидное ожирение;
- по нижнему типу или гиноидное ожирение;
- смешанное или промежуточное ожирение.



<u>При верхнем типе (тип «яблоко»</u>) ожирения жировые отложения локализуются преимущественно в верхней части тела, в основном — в области живота, шеи, лица. Данный тип ожирения характерен для мужчин, у женщин можно встретить такой тип ожирения в период менопаузы. Развивается он после полового созревания.

<u>Гиноидный тип (тип «груша»)</u> ожирения характеризуется локализацией жировой ткани в нижней части тела (в бедренной и ягодичной областях) и чаще наблюдается у представительниц женского пола, фигура которых приобретает «грушеобразную» форму. Развивается чаще всего с раннего детства.

<u>Для смешанного типа</u> ожирения характерна тенденция относительно равномерного распределения жировой ткани по организму



Существует простой и достаточно точный способ оценки характера распределения жира — измерение окружности талии. Риск метаболических нарушений и развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, возрастает, если окружность талии у женщин более 80 см., а у мужчин — более 94 см.

## КАК ПОДСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ОРГАНИЗМЕ И ГДЕ ГРАНИЦЫ НОРМЫ

Для определения избыточного веса используется расчёт индекса массы тела (ИМТ). Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: отношение массы тела (в кг) к росту (в  $\rm m^2$ ). Например, если вес 90 кг, а рост 160 см. (1,6м), то рассчитываем ИМТ.

90
$$MMT = \frac{90}{1.6^2}$$

Идеальным считается ИМТ, равный у женщин 19-24 кг/м<sup>2</sup> ,а у мужчин 19-25 кг/м<sup>2</sup>.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (ИМТ)	ТИПЫ МАССЫ ТЕЛА
меньше 18,5 кг/м <sup>2</sup>	Дефицит массы тела
от $18,5 - 24,9 \text{ кг/м}^2$	Нормальная масса тела
от $25,0-29,9 \text{ кг/м}^2$	Избыточная масса тела
от $30,0$ - $34,9$ кг/м <sup>2</sup>	Ожирение I степени
от $35,0 - 39,9 \text{ кг/m}^2$	Ожирение II степени
больше или равно 40 кг/м <sup>2</sup>	Ожирение III степени

#### КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ

Основной причиной ожирения у взрослых, и детей является переедание и малоподвижный образ жизни. Постоянное переедание ведёт к нарушениям в работе центра аппетита в головном мозге, и нормальное количество съеденной пищи уже не может подавить в нужной степени чувство голода. Такой человек вынужден переедать, чтобы не испытывать постоянного голода.

Вторым важнейшим фактором, приводящим к развитию ожирения, является низкая физическая активность, когда даже нормальное количество принимаемой пищи является избыточным, так как калории, поступившие в организм, с едой, не «сжигаются» в процессе физических нагрузок, а превращаются в жир.

Ещё одним значительным фактором, способствующим развитию ожирения, является неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя. В последние годы неопровержимо доказано, что алкоголь, даже в небольших дозах, резко вмешивается в работу поджелудочной железы. Регулярно приём алкоголя практически всегда ведёт к развитию ожирения.



Лучший способ избавиться от лишнего веса

– изменить своё пищевое поведение

(привычки питания)

и вести более активный образ жизни



#### ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ МАССЫ ТЕЛА:

- 1. Сделайте ваше питание разнообразным, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества.
- 2. Уменьшайте калорийность пищи за счёт:
  - ограничения насыщенных жиров (жиров животного происхождения) не более 1/3 от общего жира;
  - приготовление блюд на пару, запекания или с добавлением небольшого количества растительного масла;
  - ограничения потребления продуктов, богатых холестерином (содержание холестерина в суточном рационе не должно превышать 200-250 мг). Выбирайте нежирное мясо, рыбу, курицу без кожи.
- 3. Избегайте длительных перерывов между приёмами пищи. Оптимальным считается 5-кратный режим питания малыми порциями, при появлении чувства голода перекусывайте несладкими фруктами или пейте воду.
- 4. Старайтесь не переедать! Ешьте медленно, хорошо пережёвывая пищу. Если есть быстро, чувство насыщения отстаёт от количества поглощаемой пищи и человек переедает. Выпейте перед едой стакан столовой или минеральной воды без газа она заполнит желудок и немного утолит голод. Положите в тарелку сразу всю порцию еды и откажитесь от добавки.
- 5. Включайте в рацион салаты из овощей и фруктов, богатых пищевыми волокнами.
- 6. Употребляйте фрукты, овощи и ягоды в свежем виде, не менее 400-600г в день.
- 7. Снижайте потребление сахара, сладостей, выпечки. Хлеб выбирайте из муки грубого помола или с отрубями.
- 8. В течение недели нужно проводить 1 разгрузочный день, например фруктово-овощной.
- 9. Употребляйте нежирное молоко, кефир (до 1%), йогурт, творог, блюда из овсяной крупы (100г овсянки в день снижают уровень плохого «холестерина» на 14%).
- 10. Используйте соль с пониженным содержанием натрия; вместо соли лучше добавлять пряности.
- 11. Порция гарнира должна быть не более 4-6 столовых ложек.
- 12. Последний приём пищи должен быть за 4 часа до сна, но не позднее 20.00
- 13. Сбросить вес и поддерживать его на должном уровне непросто. Постепенно снижайте вес на 400-500 г в неделю, пока не достигните желаемого результата. Такой темп обеспечивает его снижение на 10% от исходного за полгода.
- 14. Исключите или снизьте потребление алкоголя.
- 15. Ежедневно занимайтесь спортом и гуляйте на свежем воздухе.



Когда правильное питание войдёт в привычку, а это происходит примерно через месяц, для вас уже не будет вопроса, что и сколько есть. Главное — не лениться и по-настоящему обрадоваться новому стройному и красивому телу, а также знать, что правильное питание — это не диета, это привычка на всю жизнь!

Поддерживая вес в оптимальных рамках, вы будете лучше себя чувствовать, снизите риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а значит, улучшите качество своей жизни.